

REZZAYO 200 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Wirkstoff: Rezapfungin (als Acetat)

Verschreibungspflichtig.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.

Zusammensetzung: *Arzneilich wirksamer Bestandteil:* Jede Durchstechflasche enthält 200 mg Rezapfungin (als Acetat). *Sonstige Bestandteile:* Mannitol, Histidin, Polysorbat 80, Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung), Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung)

Anwendungsgebiete: REZZAYO wird angewendet zur Behandlung der invasiven Candidainfektion bei Erwachsenen. Es sind die offiziellen Richtlinien zur sachgemäßen Anwendung von Antimykotika zu beachten.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile, Überempfindlichkeit gegen andere Arzneimittel der Klasse der Echinocandine.

Nebenwirkungen: Anämie; Hypokaliämie, Hypomagnesiämie, Hypophosphatämie, Hyperphosphatämie, Hyponatriämie; Hypotonie; Giemen; Diarrhoe, Erbrechen, Übelkeit, Abdominalschmerz, Obstipation; Erythem, Ausschlag, Phototoxizität, Urtikaria; Tremor; Fieber; erhöhte alkalische Phosphatase im Blut, erhöhte Leberenzyme, erhöhte Alaninaminotransferase, erhöhte Aspartataminotransferase, erhöhtes Bilirubin im Blut, erhöhte Eosinophilenzahl; Infusionsbedingte Reaktionen (Rötung, Gefühl der Wärme, Übelkeit und Brustenge)

Warnhinweis: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mundipharma GmbH, 60549 Frankfurt am Main

12-23