**REZZAYO 200 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**

Wirkstoff: Rezafungin (als Acetat) Verschreibungspflichtig.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.

**Zusammensetzung:** *Arzneilich wirksamer Bestandteil:* Jede Durchstechflasche enthält 200 mg Rezafungin (als Acetat). *Sonstige Bestandteile:* Mannitol, Histidin, Polysorbat 80, Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung), Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung)

**Anwendungsgebiete:** REZZAYO wird angewendet zur Behandlung der invasiven Candidainfektion bei Erwachsenen. Es sind die offiziellen Richtlinien zur sachgemäßen Anwendung von Antimykotika zu beachten.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile, Überempfindlichkeit gegen andere Arzneimittel der Klasse der Echinocandine.

**Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Anämie; Hypokaliämie; Diarrhoe; Fieber. Häufig: Hypomagnesiämie, Hypophosphatämie; Hypotonie; Giemen; Erbrechen, Übelkeit, Abdominalschmerz, Obstipation; Erythem, Ausschlag; erhöhte alkalische Phosphatase im Blut, erhöhte Leberenzyme, erhöhte Alaninaminotransferase, erhöhte Aspartataminotransferase, erhöhtes Bilirubin im Blut; Infusionsbedingte Reaktionen (wie Rötung, Gefühl der Wärme, Übelkeit und Brustenge). Gelegentlich: Hyperphosphatämie, Hyponatriämie; Phototoxizität; Tremor; erhöhte Eosinophilenzahl. Nicht bekannt: Urtikaria.

**Warnhinweis:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Mundipharma GmbH, 60549 Frankfurt am Main** **02-25**